

Mujer de 13 años y 8 meses, que desde hace 6 meses presenta pérdida de peso progresiva de hasta 10 kg. La paciente se siente delgada pero tiene miedo a engordar; por ello restringe calorías y líquidos ingeridos. Hace gimnasia después de comer, padece insomnio y duerme poco. En alguna ocasión la han visto tirar la comida. No se provoca vómitos. Tampoco presenta crisis de bulimia. Según su madre tiene ansiedad y temores sexuales con tendencia a la depresión. Aun no ha presentado su menarquia. EF: Peso, -3 DS; Talla, -1.5 DS; TA 100/70; T 35,8 °C; FC 110 x m. Hidratación adecuada, palidez generalizada, desnutrición severa con ausencia de pániculo adiposo. Masas musculares hipotróficas. Hipertricosis generalizada. Los caracteres sexuales secundarios están sub desarrollados para la edad cronológica.



ETIOLOGIA	% PARTICIPANTES
Nutricional	82%
Metabólica	41%
Genética	23%
Autoinmune	5%

LABORATORIO	% PARTICIPANTES
Biometría Hemática	82%
Química Sanguínea	77%
Perfil Tiroideo	77%
Perfil Suprarrenal	68%
Perfil Hormonal Ginecológico	68%
Perfil hormonal Hipofisario	41%
Electrolitos Séricos	41%
Examen General de Orina	32%
Niveles de Hemtínicos	27%
Coagulograma	14%
Cariotipo	9%
HBA1C	5%

PROBABLE DIAGNOSTICO	% PARTICIPANTES
Anorexia Nerviosa	77%
Hipotiroidismo	27%
Sx de Turner	9%
Hipogonadismo	9%

GABINETES	% PARTICIPANTES
TAC DE ABDOMEN Y PELVIS	41%
TELE DE TORAX	36%
ELECTROCARDIOGRAMA	32%
TAC CRANEO	23%
US ABDOMEN Y PELVIS	23%
DENSITOMETRIA OSEA	23%
RMN CRANEO	9%
GAMAGRAMA TIROIDEO	5%
BIOPSIA DE OVARIOS	5%
ELECTROENCEFALOGRAMA	5%

DIAGNOSTICO	ANOREXIA NERVIOSA
DEFINICION	Es un trastorno alimentario que lleva a que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con peso insuficiente. Pueden hacer dietas, ejercicio excesivo u otros métodos para bajar de peso
ETIOLOGIA	Se le considera una enfermedad idiopática ya que o se conocen sus causas exactas. Muchos factores probablemente estén relacionados. Los genes y las hormonas pueden jugar un papel. Las actitudes sociales que promueven tipos de cuerpos muy delgados también pueden contribuir. Ya no se cree que los conflictos dentro de una familia contribuyan a éste u otros trastornos alimentarios
PRESENTACION	La anorexia generalmente comienza durante los años de adolescencia o a principios de la edad adulta y es más común en mujeres, aunque también se puede ver en hombres. El trastorno se observa principalmente en mujeres de raza blanca, de alto rendimiento académico y que tienen familia o personalidad orientada hacia el logro de metas.
TRATAMIENTO	Psicoterapia, terapia de grupo, psicofármacos, en casos graves se puede requerir de la hospitalización
PRONOSTICO	Se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal cuando no es atendida en forma adecuada y oportuna
BIBLIOGRAFIA	http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000362.htm