



Masculino de 56 años de edad que ingresa a emergencias con padecimiento de presentación post-prandial después de 3 horas de ingesta abundante en alcohol y grasas, caracterizado por dolor transitorio en epigastrio en hipocondrio derecho. A la EF se encuentra paciente obeso con TA 100/60, FC 110 x min, T 37.5 °c. El abdomen se encuentra rigido, doloroso 4+, con signo de rebote positivo. Se indica ayuno, sonda nasogastrica, solución Mixta IV. En la BH de urgencias se encuentra Hto 40% , Leucocitosis 16 mil/uL, Plaquetas 160 mil/uL, Glucosa 225 mg/dL



ETIOLOGIA	% PARTICIPANTES
Metabólica	77%
Nutricional	46%
Tóxica	38%
Infecciosa	8%
Genética	8%

PROBABLE DIAGNOSTICO	% PARTICIPANTES
Pancreatitis	100%
Colecistitis	31%
Abdomen agudo	23%
Cirrosis hepática	15%
Apendicitis	15%

LABORATORIO	% PARTICIPANTES
Amilasa y Lipasa ( suero y orina )	92%
BH	85%
QS	85%
PFH	85%
Calcio y electrolitos	38%
Gasometría	31%
EGO	15%
Grasas en heces y tripsinógeno	15%
PCR	8%
Marcadores Tumorales	8%

GABINETES	% PARTICIPANTES
Ultrasonido abdomen	85%
TAC	77%
Placa Simple de Abdomen	62%
Colangiografía ascendente	31%
Tele de Torax	23%
RMN	8%

DIAGNOSTICO	PANCREATITIS
ANATOMIA Y FISILOGIA	El páncreas es una glándula que se ubica atrás del estómago y adyacente al duodeno. Participa en la digestión de los carbohidratos y de las proteínas a través de la amilasa, de la lipasa y de la tripsina respectivamente las cuales se segregan a los jugos digestivos en el intestino delgado a través de un tubo llamado conducto pancreático. El páncreas también libera las hormonas insulina y glucagón en la sangre.
EVOLUCION	La pancreatitis es una inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. De cualquier forma es grave y puede traer complicaciones.
PANCREATITIS AGUDA	La pancreatitis aguda ocurre de repente y generalmente desaparece en pocos días con tratamiento. A menudo es causada por cálculos biliares, ingesta masiva de grasas y alcohol. Los síntomas comunes son dolor intenso en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos. El tratamiento suele ser fluidos, antibióticos y analgésicos por vía intravenosa durante unos días en el hospital
PANCREATITIS CRONICA	La pancreatitis crónica no se cura o mejora. Empeora con el tiempo y lleva a daño permanente. La causa más común es un consumo excesivo de alcohol. Otras causas pueden ser fibrosis quística y otras enfermedades heredadas, grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, pérdida de peso y heces grasosas. El tratamiento suele ser fluidos, analgésicos por vía intravenosa y nutrición artificial durante unos días en el hospital. Luego de su estadía en el hospital, deberá tomar enzimas y llevar una dieta especial. También es importante no fumar ni beber alcohol.
BIBLIOGRAFIA	<a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pancreatitis.html">http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pancreatitis.html</a>